



Acepta el reto, ¡Vacunate!

Accept the challenge, get vaccinated!

Increasing pneumococcal and influenza vaccine coverage among the adult population in Puerto Rico

Key objectives:

- Assess and strengthen Pneumococcal and Influenza standing order system in order to improve vaccination coverage
- Develop capacity among health care providers and non-physician clinicians to modify health behaviors and increase education
- Provide vaccinations in healthcare settings to increase access
- Develop a culturally appropriate adult vaccination campaign to increase education and outreach

This project had been possible thanks to:



And the collaboration of:



Main achievements:

Hospitals Standing Orders

- Survey hospitals with the collaboration of Puerto Rico Department of Health, Puerto Rico Hospitals Association and the Puerto Rico Epidemiologist Association
- Main findings:
 - 85% of participating hospitals have a Pneumococcal and Influenza vaccination protocol
 - 43% of those for older adults 65+
 - 86% for employees.
 - A total of 87% of participating hospitals offer vaccination directly (at least to employees) and 13% refer to other settings for this service.
 - Only 15% reported to count written standing orders.



Possible barriers to implementing Standing Orders:


- Not required by Joint Commission, nor Medicare
- No Medicare reimbursement due to per diem of hospital care
- Other priorities


Main achievements:

Develop capacity among HCP

- Provided quality educational conference and materials to physicians, nurses and other healthcare providers
 - IMCO
 - Immunization Update Summits
- Provided interactive quality educational conference to several professional groups.
 - Puerto Rico Epidemiologists Association,
 - Volunteers from SHIP (State Health Insurance Program, Office of the Advocate for Seniors)
 - Faculty and Students from
 - UCC (Central Caribbean University)
 - Pharmacy Assistant Students at Ponce Paramedical College
 - Pharmacist Students at UPR
- Participated on professional meetings through educational table and educational materials dissemination:
 - Academy of Family Physicians 2014, 2015 & 2016 Convention
 - ProGyn Sunshine Seminar 2014 & 2016
 - Pharmacists College 2014 & 2016 Convention

Estimate reach: 5,465 professionals






Main achievements: Adult vaccination campaign

- Vaccination promotional efforts to educate and mobilize elders to get vaccinated

- Press releases
- Press conferences
- Media tour
- Radio spots
- Video clips
- Editorials
- Printed materials (posters, flyers, etc.)
- Community outreach
- Estimated reach 70,000 persons



ATENCIÓN

PACIENTE DE MEDICARE ADVANTAGE:

¡Influenza! - Un día de año nuevo, la gripe puede ser una pesadilla. ¡Vacúnate contra la gripe y la neumonía!

Pneumonia - La gripe puede ser una pesadilla. ¡Vacúnate contra la gripe y la neumonía!

Tetano Difteria Tétanos - ¡Vacúnate contra el tétanos, la difteria y el tétanos!

Culebrilla - ¡Vacúnate contra la culebrilla!

ATENCIÓN

Paciente de Medicare Advantage o Medicare Original:

- Constellation Health
- Humana Medicare Advantage
- Magire
- MCS Classicare
- MMH, PNC y First+Plus
- Triple S Advantage
- United Healthcare

¡Usted debe vacunarse contra la PULMONÍA.

Tiene derecho a las dos vacunas con **cero (\$0) co-pagos o cero (\$0) deducibles.**

Las Guías del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización del CDC y el Departamento de Salud de PR recomiendan:

- Que cada persona de 65 años o más debe recibir una dosis de Prevenar 13® (PCV13), seguida por una dosis de Pneumovax 23® (PPV23) a los 12 meses.
- Si nunca ha sido vacunado contra la pulmonía, debe recibir primero PCV13 y 12 meses después PPV23.
- Si se vacunó anteriormente con PPV23 (12 meses o más), debe recibir la PCV13.
- Si recibió PCV13 hace 12 meses o más, ya debe recibir PPV23.

Así estará usted protegido.

¿DÓNDE VACUNARSE?

Farmacias en cadena o de la comunidad que ofrecen el servicio, centros de vacunación u oficinas médicas, Bancos de MMH, PNC y First+Plus deben orientarse sobre centros disponibles. Para vacunarse contra la pulmonía no se requiere receta médica.

Comuníquese con su plan médico para orientarse sobre dónde es el centro de vacunación más cercano.

Si no logra acceso a sus vacunas, reportelo llamando libre de costo al Programa Estatal de Asistencia Sobre Seguros de Salud SHIP

San Juan (1-877) 725-4300
Ponce 1-800-981-7735
Mayagüez 1-800-981-0056

Elija Prevenir. ¡Vacúnese!

Un mensaje de VOICES, Coalición de la Vacunación de Puerto Rico. Para más información llame al (787) 789-4006



¡Asegúrate de tener todas las vacunas!

INFLUENZA

- Infección respiratoria contagiosa, fácilmente transmisible
- Síntomas como: fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y garganta, dolor y tos seca y complicaciones a condiciones pre-existentes
- Su prevención incluye el lavado de manos constante así como la vacuna anual
- Los adultos de 65+ deben recibir la vacuna intramuscular inactiva (toda la vida)

NEUMOCOCCO

- Causa principal de pulmonía en adultos
- Síntomas similares a los de influenza y otros como: dificultad respiratoria y pérdida de apetito
- Dos vacunas conjugada (PCV13) y entre 8 a 12 meses después la polisacárida (PPV23)

CULEBRILLA

- Infección viral causada por el virus de la varicela
- Síntomas incluyen: erupción de la piel, dolor de cabeza, escalofríos y malestar general
- Complicaciones pueden conllevar a: ceguera, sordera, meningitis, parálisis, encefalitis o incluso la muerte
- Una vacuna contra herpes zoster a partir de los 60 años si alguna vez sufrió varicela

TETANOS

- Toda vacuna múltiple contra las bacterias del tétano, la difteria y la tos ferina
- Estas enfermedades no han desaparecido y pueden llegar a ser mortales
- La vacuna indicada una vez a partir de los 65 años seguida por un refuerzo de 10 cada 10 años

HEPATITIS B

- Enfermedad infecciosa del hígado causada por alguno de los virus de hepatitis que afecta la función del hígado
- Síntomas pueden incluir ictericia (coloración amarilla la piel o los ojos, orina de color oscuro) y dolor abdominal
- La vacuna indicada una vez a partir de los 65 años seguida por un refuerzo de 10 cada 10 años
- Las vacunas están indicadas para personas en riesgo, consulte con su médico si la vacuna es indicada para usted
- Se debe contra Hepatitis A (HVA) dos dosis
- Se debe contra Hepatitis B (VHB) tres dosis